



35.1 杂交瘤细胞抗 CD2

本产品仅供科研实验使用

基本信息

产品品牌：通蔚生物

中文名称：杂交瘤细胞抗 CD2

细胞简称：35.1

细胞形态：淋巴母细胞样

生长特性：悬浮细胞

培养环境：空气, 95% ; CO₂, 5%

冻存条件：55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO 液氮

完全培养基：RPM I-1640(P M 150110) + 10% FBS(164210-50) + 1% P/S(P B 180120)

传代步骤

可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养，离心转速参考 1200 rpm (250g 左右)，离心 3 分钟。

传代比例 (密度)：3×10⁵-5×10⁵ cells/mL

换液频次：2~3 次/周

细胞背景描述



动物用佛波醇肉豆蔻酸(PMA)活化的人 T 淋巴细胞免疫。脾细胞与 P3/N S1/1-A g4.1 骨髓瘤细胞融合。抗体与人 T 细胞表面蛋白 T p50(CD2)反应。抗体抑制 T 细胞增殖反应和细胞毒反应, 但不抑制抗体倡导的细胞毒反应。

细胞类型 : 肿瘤细胞

肿瘤类型 : 杂交瘤细胞

收到常温细胞后如何处理

细胞培养详细操作步骤请参照通蔚生物细胞培养操作指南

1. 收到常温细胞后, 及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用 75%酒精擦拭细胞培养瓶表面, 显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖, 将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2-4 小时, 以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书, 了解细胞相关信息, 如贴壁特性 (贴壁/悬浮)、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后, 取出细胞培养瓶, 镜检、拍照, 记录细胞状态 (所拍照片 将作为后续服务依据); 建议细胞传代培养后, 定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问, 请及时跟我们联系; 对于细胞培养操作及培养。可跟我们的技术支持交流。

售前须知

该细胞为悬浮细胞, 请注意离心收集细胞悬液; 请勿直接倒掉细胞培养液。

官网网址 : www.tw-reagent.com

订购热线 : 021 - 54845833

咨询 QQ : 2881498548



咨询电话：15800441009(微信同号)