



Jurkat, Clone E6-1 人 T 淋巴细胞白血病细胞

本产品仅供科研实验使用

基本信息

产品品牌：通蔚生物

中文名称：人 T 淋巴细胞白血病细胞

细胞简称：Jurkat, Clone E6-1

细胞形态：淋巴细胞样

生长特性：悬浮细胞

培养环境：空气, 95% ; CO₂, 5% 37°C

冻存条件：55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO 液氮

完全培养基：RPMI-1640(P M 150110) + 10% FBS(164210-50) + 1% P/S(P B 180120)

传代步骤

可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养，离心转速参考 1200 rpm (250g 左右)，离心 3 分钟



传代比例 (密度) : $3 \times 10^5 - 5 \times 10^5$ cells/mL

换液频次 : 2~3 次/周

细胞背景描述

Jurkat, Clone E6-1 细胞是 Jurkat-FH C R C 细胞株 (Jurkat 细胞株的衍生) 的一个克隆。

Jurkat, Clone E6-1 细胞来源于一个 14 岁男孩的外周血, 经佛波酯和外源凝集素或抗 T3 单克隆抗体 (两种类型的诱导都需要) 诱导后可产生大量 IL-2。

倍增时间 : ~ 24-48 hours

供体年龄 : 男

组织来源 : T 淋巴细胞; 急性 T 细胞白血病

细胞类型 : 肿瘤细胞

肿瘤类型 : 白血病细胞

生物安全等级 : 1

受体表达 : T cell antigen receptor, expressed

抗原表达 : CD3; Human, expressed

基因表达 : interleukin-2 (interleukin2, IL-2), CD3; Human, expressed

细胞保藏中心 : ATCC ; TIB-152 BC RC ; 60424 BC RJ ; 0125EC AC C ; 88042803

收到常温细胞后如何处理



细胞培养详细操作步骤请参照通蔚生物细胞培养操作指南

1. 收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用 75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2-4 小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片 将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟我们联系；对于细胞培养操作及培养。可跟我们的技术支持交流。

售前须知

该细胞为悬浮细胞，请注意离心收集细胞悬液；请勿直接倒掉细胞培养液。

官网网址：www.tw-reagent.com

订购热线：[021 - 54845833](tel:021-54845833)

咨询 QQ：[2881498548](https://www.qq.com/number/2881498548)

咨询电话：[15800441009](tel:15800441009)(微信同号)

