



Kasumi-1 人急性原粒细胞白血病细胞

本产品仅供科研实验使用

基本信息

产品品牌：通蔚生物

中文名称：人急性原粒细胞白血病细胞

细胞简称：Kasumi-1

细胞形态：原粒细胞

生长特性：悬浮细胞

培养环境：空气，95%；CO₂，5% 37°C

冻存条件：55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO 液氮

完全培养基：RPMI-1640(P M 150110) + 20% FBS(164210-50) + 1% P/S(P B 180120)

传代步骤

可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养，离心转速参考 1200 rpm (250g 左右)，离心 3 分钟



传代比例 (密度) : 1:2-1:4

换液频次 : 2~ 3 次/周

细胞背景描述

K asumi-1 细胞具有人急性淋巴白血病细胞的典型特征,是研究人急性淋巴白血病的极佳材料。K asumi-1 细胞是一个带有 8: 21 号染色体转位的白血病细胞株,这个转位使得 A M L1 基因和 ETO (或称 M T G 8)基因串联,使融合基因 A M L1-ETO (也称作 A M L 1-M T G 或 R U N X1-CBF2T 1)的表达升高,因而细胞产生嵌合的 A M L1-ETO 蛋白。这个蛋白下调 C E B P A m R N A 、蛋白和 D N A 的结合活性,而这种结合对粒性白细胞的分化是极端重要的。K asumi-1 细胞建立于一位急性白血病患者的外周血, K asumi-1 细胞髓过氧化物酶阳性,显示其髓性成熟的形态。增生试验显示,培养的 K asumi-1 细胞对 IL-3、IL-6、G -C S F(粒细胞集落刺激因子)、G M -C S(粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子)有响应,但对 IL-1 和 IL-5 没有响应。在体外液体培养中分别加入二甲亚砷、G -C S F、IL-5, 也没有观察到粒性或嗜酸性细胞的成熟。K asumi-1 细胞培养过程中,加入佛波酯可以看到诱导出的巨噬细胞样细胞。

倍增时间 : ~ 48-72 hours

供体年龄 : 男; 7 岁

组织来源 : 外周血, 急性原粒细胞白血病

细胞类型 : 肿瘤细胞



肿瘤类型：白血病细胞

生物安全等级：1

细胞保藏中心：ATCC；C RL-2724 D SM Z；AC C -220

收到常温细胞后如何处理

细胞培养详细操作步骤请参照通蔚生物细胞培养操作指南

1. 收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用 75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2-4 小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片 将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟我们联系；对于细胞培养操作及培养。可跟我们的技术支持交流。

官网网址：www.tw-reagent.com

订购热线：[021 - 54845833](tel:021-54845833)

咨询 QQ：[2881498548](https://www.qq.com/number/2881498548)



咨询电话：[15800441009](tel:15800441009)(微信同号)